

Kabócák ellen engedélyezett szerek szőlőben	Forg Kategória.	Méhveszélyesség	Vízi szervezetekre való veszélyesség	védőtávolság minimum víztől
Actara SC	II.	*kifejezetten kockázatos	kifejezetten veszélyes	5 m
Bulldock 25 EC	II.	*kifejezetten kockázatos	kifejezetten veszélyes	10 m
Daskor	I.	*kifejezetten kockázatos	kifejezetten veszélyes	20 m
Decis	III.	**mérsékelt kockázatos	kifejezetten veszélyes	20 m
Decis Mega	II.	**mérsékelt kockázatos	kifejezetten veszélyes	20 m
Fendona 10 EC	II. ; III.	**mérsékelt kockázatos	kifejezetten veszélyes	50 m
Kaiso EG	II.	**mérsékelt kockázatos	kifejezetten veszélyes	50 m
Kaiso Garden	III.	**mérsékelt kockázatos	kifejezetten veszélyes	50 m
Karate Zeon 5 CS	III.	**mérsékelt kockázatos	kifejezetten veszélyes	35 m
Laser	II.	**mérsékelt kockázatos	kifejezetten veszélyes	20 m
Luzindo	II.	*kifejezetten kockázatos	kifejezetten veszélyes	10 m
Nurelle D 50/500 EC	I.	*kifejezetten kockázatos	kifejezetten veszélyes	15 m
Mavrik 24 EW	II. ; III.	nem jelölésköteles	kifejezetten veszélyes	50 m
Movento	I	*kifejezetten kockázatos	kifejezetten veszélyes	5 m
Pyrinex 25 CS	I.	*kifejezetten kockázatos	kifejezetten veszélyes	50 m
Reldan 22 EC	I.	*kifejezetten kockázatos	kifejezetten veszélyes	20 m
Spin Tor	II. ; III.	**mérsékelt kockázatos	kifejezetten veszélyes	20 m

\*A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében virágzási időszakban nem alkalmazható! Mézharmat vagy virágzó gyomnövények jelenléte esetén nem alkalmazható!

\*\*Virágzó kultúrákban vagy mézharmat és virágzó gyomnövények jelenléte esetén, illetve ha a területet bármely okból a méhek látogatják, kizárólag méhkímélő technológiával juttatható ki. Ilyenkor a védekezés csak a méhek repülési időszakának befejezését követően, legkorábban a csillagászati naplemente előtt egy órával kezdhető meg. A kezelést 23 óráig be kell fejezni, illetve 23 órától a következő nap alkonyatáig szüneteltetni kell.